

Коронавирусное заболевание 2019 (COVID-19)

Принципы контактирования с владельцем

Дж. Скотт Уиз, доктор ветеринарной медицины (DVM), доктор ветеринарных наук (DVSc),
дипломант Американского ветеринарного колледжа внутренних болезней (DACVIM)

Гуэлфский университет

Опубликовано 30 марта 2020 года.

Экстренная или неотложная помощь, просроченная вакцинации от бешенства, завершение ревакцинации или другие существенные поводы для посещения?			
да			нет
У кого-либо из совместно проживающих в одном помещении с владельцем диагностировано* коронавирусное заболевание или есть подозрение об инфицировании COVID-19?			Отложите или перенесите визит; рассмотрите возможность использования телемедицины для профилактических осмотров, несрочных консультаций или корректировки лекарственной терапии
да		нет	
Кто-то еще может доставить питомца в клинику?		перенёс ли владелец недавно¹ какое-либо респираторное заболевание?	
нет	да	да	нет
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Сообщите ответственному за инфекционный контроль клиники, при наличии такой возможности, и ожидайте дальнейших рекомендаций. ➤ Переместите животное из автомобиля непосредственно в изолированную зону, в идеале через запасной вход, используйте СИЗ • Рассмотрите возможность перенаправить животное в другое учреждение, если в вашей клинике не доступны СИЗ и навыки работы с такими пациентами.² 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Переместите животное из автомобиля, используя СИЗ² ➤ Соблюдайте дистанцию в 2 метра с владельцем ➤ Переместите животное непосредственно в изолированную зону, в идеале через запасной вход ➤ Сообщите ответственному за инфекционный контроль клиники, при наличии такой возможности 	Кто-то еще может доставить питомца в клинику?	
		да	нет

* в течение двух недель

¹ Если владелец был инфицирован и выздоровел более чем за 14 дней до обращения ко врачу и не было дальнейшего распространения инфекции среди совместно проживающих с ним в одном помещении лиц, пациент может считаться входящим в группу низкого риска.

² Весь персонал, контактирующий с пациентом, должен быть как минимум в медицинских халатах и перчатках.

Сотрудники, не участвующие в процедурах, в кабинет не допускаются.

Маска, защитные очки или защитный щиток должны надеваться в случае близкого контакта во время фиксации и процедур.

Для работы, которая может потребовать контакта с аэрозольными частицами (например, при осмотре головы собаки, при интубации), вместо хирургической маски необходимо использовать маску №95. Если маска №95 недоступна, приемлемой заменой может считаться хирургическая маска и защитный щиток при условии принятия мер для обеспечения работы лицом к лицу пациента во время выделения аэрозолей (чтобы избежать заражения с боковых частей лица).